



Er zijn ook situaties waarin permanente make-up niet wordt geadviseerd.

- Bij zwangerschap (en borstvoeding) wordt permanente make-up afgeraden. Bij langere periode van borstvoeding kan het in overleg.
- Bij hemofilie wordt permanente make-up afgeraden.
- Draag je contactlenzen, dan deze voor de behandeling van de eyeliner uit doen.
- Chronische huidziekte zoals eczeem, in overleg met de arts en pmu specialist.
- Heb je diabetes dan geneest permanente make-up vaak slechter en is er een langere tussenperiode nodig met bijwerken.
- Heb je een immuunstoornis dan geneest permanente make-up slechter en mogen we pas na 8 weken weer bijwerken.
- Bij hart- en vaatafwijking graag aangeven of je bloedverduunners gebruikt.
- Ben je bloeddonor dan mag je na 6 weken weer bloed geven.
- Heb je een schildklierziekte dan is de genezing slechter.
- Heb je een plastisch chirurgie behandeling in het te behandelde gebied ondergaan (fillers, ooglid etc.), dan kan er 3 maanden later permanente make-up gezet worden.
- Bij herpes zoster (gordelroos) adviseer ik om geen permanente make-up te laten zetten.
- Gebruik je Roaccutane (isotretioïne) dan kan permante make-up niet! Tenzij de arts het goed vindt.
- Heb je keloïd vorming dan kan permante make-up niet.
- Bij het gebruik van sterke vitamine A crème of zalf, eerst overleg met mij.
- Bij koortsuitslag op de lippen mag permante make-up niet. Als de plek volledig is genezen adviseer ik om drie maanden *Spirularin te gebruiken voordat de permanente make-up gezet gaat worden.
- *Spirularin is via mij verkrijgbaar.